

MÉDICAMENTS CAUSANT DE LA SÉCHERESSE BUCCALE

Médicaments per os, injectable ou transdermique.

Médicament	Fréquence	Indication	Classe pharmacologique
Alprazolam (Xanax®)	10 % +	Anxiété, trouble de panique	Benzodiazépine
Amitriptyline (Elavil®)	30 %	Dépression, douleurs neurologiques	Antidépresseur tricyclique
Aténolol (Ténormin®)	12,2%	Hypertension	Beta-bloqueur
Benztropine (Cogentin®)	10 % +	Tremblement	Anticholinergique
Bupropion (Wellbutrin®)	13-16,5 %	Dépression, arrêt tabagique	Antidépresseur
Chlordiazepoxide (Librium®)	10 % +	Anxiété	Benzodiazépine
Chlorpromazine (Largactil®)	30 % +	Agitation, hoquet, nausée	Antipsychotique
Citalopram (Célexa®)	19,4 %	Dépression avec anxiété	Antidépresseur (ISRS)
Clomipramine (Anafranil®)	50 %	Dépression	Antidépresseur tricyclique
Clonazépam (Rivotril®)	10 % +	Anxiété, myoclonie, trouble de panique, sommeil	Benzodiazépine
Clonidine (Catapres®)	40 %	Douleur, hypertension, sevrage	Agoniste alpha-adrénergique
Clorazéate (Tranxène®)	10 % +	Anxiété, insomnie	Benzodiazépine
Clozapine (Clozaril®)	30 % +	Psychose ou schizophrénie réfractaire	Antipsychotique
Codéine	20 %	Douleurs, toux	Narcotique
Cyclobenzaprine (Flexeril®)	21-32 %	Spasme musculaire	Relaxant musculaire
Darifenacine (Enablex®)	20,2-35,3%	Vessie neurogène ou hyperactive	Anticholinergique
Desipramine (Norpramin®)	10 % +	Dépression, douleurs	Antidépresseur tricyclique
Diazépam (Valium®)	10 % +	Agitation, anxiété, relaxant musculaire, sevrage	Benzodiazépine
Dicyclomine (Bentylol®)	+++	Crampes abdominales	Antispasmodique intestinale
Disopyramide (Rythmodan®)	32 %	Arythmie, tachycardie	Antiarythmique
Doxépine (Sinéquan®)	30 % +	Anxiété, dépression, douleur	Antidépresseur tricyclique
Dronabinol (Marinol®)	38-50 %	Anorexie, nausée	Dérivé du cannabis
Duloxétine (Cymbalta®)	15 %	Anxiété, dépression, douleurs neurologiques	Antidépresseur (ISRS)
Escitalopram (Ciprallex®)	10 % +	Anxiété, dépression	Antidépresseur (ISRS)
Fentanyl transdermique (Duragésic®)	10 % +	Douleur	Narcotique
Flavoxate (Urispas®)	10 % +	Douleurs urinaires, vessie hyperactive	Antispasmodique urinaire
Flupenthixol (Fluanxo®)	10 % +	Psychose, schizophrénie	Antipsychotique
Flurazépam (Dalmane®)	10 % +	Insomnie	Benzodiazépine
Fluvoxamine (Luvox®)	25,7 %	Anxiété, dépression, trouble de panique	Antidépresseur (ISRS)

Médicament	Fréquence	Indication	Classe pharmacologique
Glycopyrrolate (Robinul®)	10 % +	Diminution de la sécrétion salivaire, du tractus digestif et respiratoire	Anticholinergique
Hyoscine-butylbromure (Buscopan®)	+++	Spasme gastro-intestinal ou du tractus génito-urinaire	Anticholinergique
Imipramine (Tofranil®)	30 % +	Dépression, douleurs neurologiques	Antidépresseur tricyclique
Loxapine (Loxapac®)	10 % +	Psychose, schizophrénie	Antipsychotique
Maprotiline (Ludiomil®)	30 % +	Dépression	Antidépresseur
Méthadone	25 %	Douleurs neurologiques, sevrage	Narcotique
Méthotriméprazine (Nozinan®)	30 % +	Angoisse, douleurs, nausées, insomnie, psychose	Antipsychotique
Méthildopa (Aldomet®)	+++	Hypertension artérielle	Antihypertenseur
Méthildopa + Hydrochlorothiazide (Aldoril®)	+++	Hypertension artérielle	Antihypertenseur + diurétique
Mirtazapine (Remeron®)	30 % +	↑ l'appétit, dépression, insomnie	Antidépresseur
Moclobemide (Manerix®)	10 % +	Dépression	Antidépresseur (IMAO)
Morphine	10 % +	Douleur	Narcotique
Nabilone (Césamet®)	21,6 %	Douleur, nausée	Antiémétique cannabinoïde
Nortriptyline (Aventyl®)	10 % +	Dépression, douleur	Antidépresseur tricyclique
Olanzapine (Zyprexa®)	10 % +	Agitation, psychose, psychose maniaco-dépressive, schizophrénie	Antipsychotique atypique
Orphenadrine (Norflex®)		Spasme musculaire	Relaxant musculaire
Oxazepam (Sérox®)	10 % +	Angoisse, insomnie	Benzodiazépine
Oxybutynine (Ditropan®)	59-72,9 %	Spasme urinaire, vessie neurogène ou hyperactive	Anticholinergique, antispasmodique des voies urinaires
Oxybutynine transdermique (Oxytrol®)	9,6 %	Spasme urinaire, vessie neurogène ou hyperactive	Anticholinergique, antispasmodique des voies urinaires
Paroxétine (Paxil®)	18,1 %	Dépression	Antidépresseur (ISRS)
Pentazocine (Talwin®)	31,9 %	Douleur	Narcotique
Pericyazine (Neuleptil®)	30 % +	Psychose	Antipsychotique
Phenelzine (Nardil®)	30 % +	Dépression	Antidépresseur (IMAO)
Pimozide (Orap®)	25 %	Psychose	Antipsychotique
Prochlorperazine (Stemetil®)	10 % +	Nausée	Antiémétique
Procyclidine (Kemadrin®)	10 % +	Parkinson, réaction extrapyramidale	Anticholinergique
Scopolamine (Scopolamine inj ou Transderm V® timbre)	29 %	Hypersalivation, hypersécrétion bronchique, mal des transports, sédatif	Anticholinergique
Sertraline (Zoloft®)	16,3%	Dépression	Antidépresseur (ISRS)

Médicament	Fréquence	Indication	Classe pharmacologique
Sibutramine (Meridia®)	15,9 %	Obésité (coupe-faim)	-
Solifenacine (Vesicare®)	10,9-27,6 %	Vessie hyperactive ou neurogène	Anticholinergique
Tizanidine (Zanaflex®)	49 %	Spasticité	Relaxant musculaire
Tolterodine (Detrol®)	24-40 %	Vessie hyperactive ou neurogène	Anticholinergique
Tranlycypromine (Parnate®)	10 % +	Dépression	Antidépresseur (IMAO)
Trazodone (Désyrel®)	14,8 %	Dépression, insomnie	Antidépresseur
Trihexyphenidyle (Artane®)	30-50 %	Parkinson, réaction extrapyramidale	Anticholinergique
Trimeprazine (Panectyl®)	10 % +	Prurit	Antihistaminique
Trimipramine (Surmontil®)	10 % +	Dépression	Antidépresseur tricyclique
Trosipium (Trosec®)	20,1 %	Spasme urinaire	Antispasmodique
Venlafaxine (Effexor®)	22 %	Anxiété, bouffée de chaleur, dépression, phobie	Antidépresseur (ISRS)
Zuclopenthixol (Clopixol®)	13,2-25,2 %	Schizophrénie	Antipsychotique

Gouttes ophtalmiques

Médicament	Fréquence	Indication	Classe pharmacologique
Atropine (Atropine)	10 % +	Glaucome, sialorrhée, uvéite	Mydriatique
Brimonidine (Alphagan®)	25,8 %	Glaucome	Agoniste alpha-2 adrénergique

Médicaments à inhaler

Médicament	Fréquence	Indication	Classe pharmacologique
Ipratropium + Fenoterol (Duovent®)	16 %	Asthme, bronchospasme, MPOC	Bronchodilatateur
Tiotropium (Spiriva®)	16 %	Bronchospasme et MPOC	Bronchodilatateur

Référence : pharmacovigilance Online 2009.

Seuls les médicaments avec une fréquence d'effet secondaire de 10 % et plus ont été retenus.

Les médicaments de la classe des diurétiques réduiraient la sécrétion de salive. Ils sont utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle et de l'œdème.

- Diurétiques :
- Amiloride (Midamor®)
 - Furosémide (Lasix®)
 - Hydrochlorothiazide (Hydrodiuril®)
 - Indapamide (Lozide®)
 - Métolazone (Zaroxolyn®)
 - Spironolactone (Aldactone®)
 - Triamterene (Dyrenium®)